


# Klub 44 M



Termin nadsyłania rozwiązań: 31 XII 2023

Czołówka ligi zadaniowej **Klub 44 M**  
po uwzględnieniu ocen rozwiązań zadań  
857 (WT = 1,39) i 858 (WT = 3,60)  
z numeru 3/2023

Norbert Porwol	Essen	45,16
Paweł Najman	Kraków	43,16
Radosław Kujawa	Wrocław	41,33
Marcin Kasperski	Warszawa	40,29
Michał Adamaszek	Kopenhaga	39,80
Adam Woryna	Ruda Śl.	38,27
Janusz Fiett	Warszawa	36,16
Szymon Tur		35,35
Piotr Kumor	Olsztyn	35,26
Paweł Kubit	Kraków	34,44
Marek Spychała	Warszawa	31,52

Do matematycznego Klubu 44 dołącza  
z dalekiej Nadrenii pan Norbert Porwol.  
Witamy!

## Zadania z matematyki nr 867, 868

Redaguje Marcin E. KUCZMA

**867.** Wyznaczyć wszystkie liczby naturalne  $n \geq 3$ , dla których istnieje  $n$ -elementowy zbiór różnych liczb całkowitych  $M$  o następującej własności: w każdym trójelementowym podzbiorze zbioru  $M$  są dwie liczby, których suma jest potęgą liczby 2 o wykładniku całkowitym nieujemnym.

**868.** Ciąg nieskończony  $a_1, a_2, \dots$  jest dany wzorami:  $a_1 = 1$ ,

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \quad \text{dla } n \geq 1.$$

Wykazać istnienie i znaleźć wartość granicy  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - \sqrt{2n})$ .

Zadanie 868 zaproponował pan Paweł Kubit z Krakowa.

## Rozwiązania zadań z numeru 6/2023

Przypominamy treść zadań:

**863.** Wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze  $p > 2$  takie, że każda z liczb  $p + 4k^2$ , gdzie  $k = 1, 2, \dots, p-1$ , także jest liczbą pierwszą.

**864.** Znaleźć liczbę  $C > 0$  o następującej własności: dla każdej liczby całkowitej  $n \geq 1$  oraz dla każdego układu liczb rzeczywistych  $x_1, \dots, x_n$  spełniającego warunki  $x_1 \leq \dots \leq x_n$  oraz  $x_1 + \dots + x_n = 0$  zachodzi nierówność

$$\sum_{i=1}^n ix_i \geq Cn \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

Im większa stała  $C$ , tym lepsze rozwiązanie.

**863.** Niech  $p$  będzie liczbą pierwszą spełniającą podany warunek. Gdyby była to liczba postaci  $4x + 1$ , mielibyśmy  $p + 4x^2 = (2x + 1)^2$ , wbrew żądaniu, by wartościami wyrażenia  $p + 4k^2$  ( $0 < k < p$ ) były liczby pierwsze. Zatem  $p = 4x - 1$  dla pewnego całkowitego  $x \geq 1$ . Możemy również napisać  $p = 4y - 9$ , gdzie oczywiście  $y = x + 2$ .

Weźmy najpierw pod uwagę przypadek, gdy któraś z liczb  $x, y$  ma dzielnik nieparzysty  $d > 1$ . Gdyby był to dzielnik liczby  $x$ , wówczas, biorąc  $k = \frac{1}{2}(d - 1)$  (i zauważając, że skoro  $d \leq x$ , to  $0 < k < p = 4x - 1$ ), otrzymalibyśmy

$$p + 4k^2 = 4x - 1 + (d - 1)^2 = 4x + d^2 - 2d;$$

to liczba złożona, bo dzieli się przez  $d$  (i jest większa niż  $d$ ).

W takim razie jedynie  $y$  może mieć dzielnik nieparzysty  $d > 1$ . Jeśli  $d = 3$ , wówczas liczba pierwsza  $p = 4y - 9$  dzieli się przez 3, czyli równa się 3. Sprawdzamy, że  $p = 3$  spełnia wymagany warunek.

Dalej przyjmijmy, że  $d > 3$ . Bierzemy  $k = \frac{1}{2}(d - 3)$  (gdzie znow  $d \leq y$ , więc  $0 < k < p = 4y - 9$ ) i dostajemy

$$p + 4k^2 = 4y - 9 + (d - 3)^2 = 4y + d^2 - 6d;$$

jak poprzednio, to liczba złożona, bo dzieli się przez  $d$  (i jest większa niż  $d$ , skoro  $y \geq d \geq 5$ ).

Pozostała możliwość, że żadna z liczb  $x, y$  nie ma dzielnika nieparzystego  $d > 1$ , czyli że obie są potęgami dwójki. Przy tym różnią się o 2, więc muszą to być liczby  $x = 2, y = 4$ . Wyznaczają liczbę pierwszą  $p = 7$ . Sprawdzamy, że i ona spełnia wymagany warunek.

Stąd odpowiedź: szukane liczby  $p$  to 3 i 7, i tylko one.

**864.** Przyjmijmy, że  $x_1 \leq \dots \leq x_m < 0 \leq x_{m+1} \leq \dots \leq x_n$ . Suma wszystkich  $x_i$  jest zerowa, wobec czego

$$(*) \quad \sum_{i=1}^m |x_i| = \sum_{i=m+1}^n |x_i| = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

Weźmy pod uwagę sumę liczb nieujemnych, którą oznaczmy  $S$ , oraz sumę niektórych jej składników,

oznaczoną  $S'$ :

$$S = \sum_{1 \leq j < k \leq n} (x_k - x_j), \quad S' = \sum_{1 \leq j \leq m < k \leq n} (x_k - x_j)$$

( $m, n$  to stałe; sumowanie po wszystkich wskazanych parach  $j, k$ ). Jasne, że  $S \geq S'$ . Przekształcamy te wyrażenia:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{k-1} x_k - \sum_{j=1}^n \sum_{k=j+1}^n x_j = \\ &= \sum_{k=1}^n (k-1)x_k - \sum_{j=1}^n (n-j)x_j = \sum_{i=1}^n (2i-n-1)x_i = \\ &= \sum_{i=1}^n 2ix_i - (n+1) \sum_{i=1}^n x_i = 2 \sum_{i=1}^n ix_i \end{aligned}$$

(skorzystaliśmy z założenia  $\sum x_i = 0$ ); i druga suma:

$$\begin{aligned} S' &= m \sum_{k=m+1}^n x_k - (n-m) \sum_{j=1}^m x_j = \\ &= m \sum_{k=m+1}^n |x_k| + (n-m) \sum_{j=1}^m |x_j| = \\ &= m \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |x_i| + (n-m) \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |x_i| = \frac{1}{2} \cdot n \sum_{i=1}^n |x_i| \end{aligned}$$

(użyliśmy równości (\*)). Nierówność  $S \geq S'$ , przepisana teraz jako

$$\sum_{i=1}^n ix_i \geq \frac{1}{4} \cdot n \sum_{i=1}^n |x_i|,$$


pokazuje, że  $C = \frac{1}{4}$  jest stałą uniwersalną, o jaką chodzi. Zwiększyć jej nie można, o czym świadczy przykład:  $n = 2, x_1 = -1, x_2 = 1$  (w którym  $S = S'$ ).

[Michał Adamaszek, autor zadania, zaproponował powyższe rozwiązanie. Zadanie daje się zrobić kilkoma sposobami, ale to autorskie rozumowanie wydaje się najzręczniejsze.]


# Klub 44 F




Termin nadsyłania rozwiązań: 31 XII 2023




Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

**761.** Z II prawa Kirchhoffa dla oczek zawierających amperomierz i dwa oporniki (rys. 5) wynika, że napięcia na wszystkich opornikach są takie same. Warunki zadania spełnia zamiana środkowego opornika z jednym ze skrajnych, prowadząca do równości:

$$\text{a) } R_1 = R_2, \quad \text{b) } R_2 = R_3.$$

Zamiana skrajnych oporników (czyli równość  $R_1 = R_3$ ) jest niemożliwa, bo w takim przypadku wskazania obu amperomierzy byłyby takie same).

## Zadania z fizyki nr 764, 765

Redaguje Elżbieta ZAWISTOWSKA

**764.** Na rysunku 1 pokazana jest zależność współczynnika  $n$  załamania ośrodków I, II i III od współrzędnej  $x$ . Wąska wiązka światła monochromatycznego pada na granicę rozdziału ośrodków I i II. Dla jakich kątów padania światło przejdzie do ośrodka III?

**765.** Na nieruchomy poziomy walec o promieniu  $r$  nałożona jest cienka obręcz o promieniu  $R$  (rys. 2). Znaleźć okres małych drgań obręczy w płaszczyźnie pionowej. Nie ma poślizgu między obręczą i walcem.

## Rozwiązania zadań z numeru 6/2023

Przypominamy treść zadań:

**760.** Cienki, giętki sznurek o długości  $l = 1$  m i masie  $M = 1$  kg przyczepiony jest dwoma końcami do sufitu. Odległość od sufitu do środka sznurka  $H = 0,1$  m. Znaleźć napięcie sznurka w najniższym punkcie oraz w odległości  $H/2$  od sufitu.

**761.** W obwodzie przedstawionym na rysunku 3 wskazania amperomierzy  $A_1$  i  $A_2$  wynoszą, odpowiednio,  $0,3$  A i  $0,2$  A. Po zamianie dwóch oporników miejscami wskazania te nie zmieniły się. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez baterię? Opory wewnętrzne amperomierzy i baterii są zaniedbywalne.

**760.** Rozważmy mały element sznurka o masie  $\Delta M$ , który znajduje się na wysokości  $h$ , licząc od najniższego punktu (rys. 4). Ponieważ jego długość jest bardzo mała, przyrost kąta nachylenia sznurka  $\Delta\alpha$  jest również mały. Warunek równowagi wybranego elementu w kierunku poziomym ma postać:

$$(T + \Delta T) \cos(\alpha + \Delta\alpha) = T \cos \alpha.$$

W przybliżeniu małych kątów

$$(1) \quad \Delta T \cos \alpha = T \Delta\alpha \sin \alpha.$$

Warunek równowagi w kierunku pionowym wyraża równanie

$$(T + \Delta T) \sin(\alpha + \Delta\alpha) = T \sin \alpha + \Delta M g,$$

gdzie  $\Delta M = M \Delta H / l \sin \alpha$ , stąd

$$(2) \quad T \Delta\alpha \cos \alpha + \Delta T \sin \alpha = \Delta M g.$$

Z (1) i (2) otrzymujemy  $\Delta T = Mg \Delta H / l$ . Wynika stąd, że napięcie sznurka zmienia się z wysokością  $h$ , zgodnie z wzorem  $T = T_0 + Mgh/l$ , gdzie  $T_0$  jest szukanym napięciem w najniższym punkcie.

W punkcie zawieszenia sznurka  $T_H = T_0 + Mgh/l$ . Składowa pozioma siły  $T_H$  wynosi  $T_0$ , a pionowa jest równa połowie ciężaru sznurka, zatem

$$T_H^2 = T_0^2 + M^2 g^2 H^2 / l^2 + 2MgHT_0/l = T_0^2 + M^2 g^2 / 4.$$

Napięcie sznurka w najniższym punkcie wynosi:

$$T_0 = \frac{Mgl}{8H} \left( 1 - \frac{4H^2}{l^2} \right) = 12N.$$

W odległości  $H/2$  od sufitu:  $T_{H/2} = T_0 + \frac{MgH}{2l} = 12,5N$ .

W przypadku a):

$$R_1 I_1 = R_2 I_2 \implies I_1 = I_2 = \frac{I_1 + I_2}{2} = 0,1 \text{ A},$$

natężenie prądu płynącego przez baterię

$$I = I_1 + (I_2 + I_3) = 0,1 \text{ A} + 0,3 \text{ A} = 0,4 \text{ A}.$$

W przypadku b):

$$I_2 = I_3 = \frac{I_2 + I_3}{2} = 0,15 \text{ A},$$

$$I = I_3 + (I_1 + I_2) = 0,15 \text{ A} + 0,2 \text{ A} = 0,35 \text{ A}.$$

## Skrót regulaminu

Każdy może nadsyłać rozwiązania zadań z numeru  $n$  w terminie do końca miesiąca  $n + 2$ . Szkice rozwiązań zamieszczamy w numerze  $n + 4$ . Można nadsyłać rozwiązania czterech, trzech, dwóch lub jednego zadania (każde na oddzielnej kartce), można to robić co miesiąc lub z dowolnymi przerwami. Rozwiązania zadań z matematyki i z fizyki należy przysyłać w oddzielnych kopertach, umieszczając na kopercie dopisek: **Klub 44 M** lub **Klub 44 F**. Można je przysyłać również pocztą elektroniczną pod adresem [delta@mimuw.edu.pl](mailto:delta@mimuw.edu.pl) (preferujemy pliki pdf). Oceniamy zadania w skali od 0 do 1 z dokładnością do 0,1. Ocenę mnożymy przez

współczynnik trudności danego zadania:  $WT = 4 - 3S/N$ , przy czym  $S$  oznacza sumę ocen za rozwiązania tego zadania, a  $N$  – liczbę osób, które nadesłały rozwiązanie choćby jednego zadania z danego numeru w danej konkurencji (**M** lub **F**) – i tyle punktów otrzymuje nadsyłający. Po zgromadzeniu **44** punktów, w dowolnym czasie i w którejkolwiek z dwóch konkurencji (**M** lub **F**), zostaje on członkiem **Klubu 44**, a nadwyżka punktów jest zaliczana do ponownego udziału. Trzykrotne członkostwo – to tytuł **Weterana**. Szczegółowy regulamin został wydrukowany w numerze 2/2002 oraz znajduje się na stronie [deltami.edu.pl](http://deltami.edu.pl).