

W wielu problemach spotykamy się z ciągami określonymi rekurencyjnie. Wyprowadzenie wzoru na  $n$ -ty kolejny wyraz takiego ciągu bywa często trudne. Dla niektórych takich ciągów możemy znaleźć formuły asymptotyczne, przybliżone. Wyprowadzimy pewne wzory dla ciągów danych rekurencyjnie w postaci

$$(1) \quad x_{n+1} = x_n + f(x_n);$$

gdzie o funkcji rzeczywistej  $f$  założymy, że  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$  (granica istnieje i jest równa zero).

Posłużymy się znanym z analizy twierdzeniem Lagrange'a: jeżeli funkcja  $f$  ciągła w przedziale  $[a, b]$  ma pochodną w przedziale  $(a, b)$ , to  $f(b) - f(a) = (b - a) \cdot f'(c)$ , gdzie  $c$  jest pewnym punktem przedziału  $(a, b)$ .

Ciągi rekurencyjne mają wiele wspólnego z równaniami różnicowymi. Nasze zadanie rozwiążemy układając pewne równanie różnicowe i zastępując je równaniem różniczkowym.

Jeżeli zamiast  $x_n$  napiszemy  $F(n)$ , to wzór (1) przepisze się jako

$$(2) \quad F(n+1) = F(n) + f(F(n)).$$

Funkcja  $F$  jest określona dla liczb naturalnych, możemy ją jednak z dużą dowolnością przedłużyć na liczby rzeczywiste; w szczególności możemy ją tak dobrać, by była różniczkowalna. Wtedy z (2) i z twierdzenia Lagrange'a mamy

$$(3) \quad F'(n+\Theta) = f(F(n)), \text{ gdzie } 0 < \Theta < 1.$$

Z naszego założenia o funkcji  $f$  wynika, że różnice  $f(b) - f(a)$  są małe dla dużych  $a$  i  $b$ . Jeśli zadbamy o to, by funkcja  $F$  między punktami całkowitymi miała „łagodny” przebieg, to będziemy mogli napisać przybliżoną równość

$$(4) \quad F'(n+\Theta) = F'(n),$$

a to prowadzi nas do jednorodnego równania różniczkowego

$$(5) \quad F'(x) = f(F(x)).$$

Rozwiążemy je łatwo metodą rozdzielania zmiennych. Przyjmując  $y = F(x)$  otrzymujemy  $dy/f(y) = dx$ , skąd, całkując:

$$(6) \quad \int_{y_0}^y \frac{dy}{f(y)} = x - x_0.$$

Wartości  $x_0$  i  $y_0$  to nasze warunki początkowe; w oznaczeniach „ciągowych”  $x_0$  jest numerem początkowego wyrazu ciągu,  $y_0$  to wartość tego wyrazu. Przypominając sobie stare oznaczenia, pisząc  $G(y)$  zamiast którejkolwiek funkcji pierwotnej funkcji  $1/f(y)$  i przyjmując dla uproszczenia  $n_0 = 0$  (tj. wyraz początkowy ma numer 0), mamy po bardzo łatwych rachunkach

$$(7) \quad x_n = G^{-1}(n + G(x_0)).$$

Oto i nasz przybliżony wzór na  $n$ -ty wyraz ciągu (1). Dokładność wzoru zależy od dokładności przybliżenia (3), tym lepszej im szybciej zmierza do zera funkcja  $f$ .

**Przykład 1.** Niech  $x_0 = 25$ , natomiast dla  $n \geq 1$   $x_{n+1} = x_n + 1/x_n$ . Równanie (4) dla tego ciągu

ma postać  $\int_{y_0}^y \frac{dy}{1/y} = x - x_0$ , skąd  $G(y) = y^2/2$ , tj.  $x_n = \sqrt{2n + 625}$ .

**Przykład 2.** Ciąg dany jest formułą rekurencyjną  $x_{n+1} = x_n + 2/x_n^2$  z warunkiem początkowym  $x_0 = 2$ . Po krótkich obliczeniach dostajemy wzór asymptotyczny  $x_n = \sqrt[3]{6n + 8}$ .


Dokładność przybliżenia obrazuje tabelka.

(po skrótach redakcji)



	$x_0 = 2, \quad x_{n+1} = x_n + 2/x_n^2$	
wyraz	wartość obliczona z formuły rekurencyjnej	wartość obliczona ze wzoru przybliżonego
$x_0$	2	
$x_1$	2,5	
$x_5$	3,469	3,362
$x_{10}$	4,177	4,082
$x_{20}$	5,119	5,040
$x_{50}$	6,810	6,753
$x_{100}$	8,514	8,472

Robert KOWAL



## Zadania, których nie umiemy rozwiązać (III)

Dzisiaj chcieliśmy zaproponować Czytelnikom kolejne zadanie z geometrii. Wprawdzie znamy jego rozwiązanie, ale nie satysfakcjonuje nas ono w pełni, jako dość skomplikowane. Może Czytelnicy będą umieli podać rozwiązanie prostsze?

A oto zadanie.

Niech punkty  $A, B, C$  należą do koła  $k$ . Skonstruować trójkąt wpisany w okrąg tego koła, taki by jego boki przechodziły odpowiednio przez dane punkty  $A, B, C$ .

PROOF