

## Hiperbole w czworokącie

W *Delcie* 4/2006 A. Wrzesień postawił przed Czytelnikami pytanie, w jakich czworokątach wypukłych spełniona jest równość

$$(*) \quad \sqrt{S_1 \cdot S_2} = \frac{S_3 + S_4}{2},$$

gdzie  $S_1, S_2, S_3, S_4$  oznaczają odpowiednio pola trójkątów  $\triangle ABO, \triangle CDO, \triangle BCO, \triangle DAO$ , a punkt  $O$  jest punktem przecięcia się przekątnych.



Na pewno Czytelnicy nie mieli problemów ze stwierdzeniem, że jeżeli w czworokącie zachodzi (\*), to musi on być trapezem. Wynika to z prostej obserwacji, że w dowolnym czworokącie zachodzi

$$(**) \quad S_1 \cdot S_2 = S_3 \cdot S_4.$$

Rzeczywiście, każdy z iloczynów jest równy  $\frac{1}{4}h_1h_2 \cdot |OA| \cdot |OC|$ . Zatem (\*) jest równoważna równości  $\sqrt{S_3 \cdot S_4} = \frac{S_3+S_4}{2}$ , która zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy  $S_3 = S_4$ . A to już pozwala na stwierdzenie, że  $AB \parallel CD$ .

Zastanówmy się teraz, dla jakich innych punktów  $O$  z wnętrza czworokąta wypukłego i wyznaczonych przez niego trójkątów spełniona jest równość (\*\*). Szybko zauważamy, że może to być dowolny inny punkt należący do którejś z przekątnych. A jak układają się punkty, dla których  $S_1 \cdot S_2 - S_3 \cdot S_4 = c$  dla pewnej niezerowej stałej  $c$ ? Okazuje się, że dostaniemy albo zbiór pusty, albo fragment hiperboli, której asymptoty zawierają przekątne naszego czworokąta. A co będzie, jeśli dopuścimy także punkty  $O$  leżące poza czworokątem? Czy otrzymane krzywe mają jakieś ciekawe geometryczne własności powiązane z wyjściowym czworokątem? A co z wyrażeniem  $(S_1 + S_2) - (S_3 + S_4) = c$ ? Zachęcamy Czytelników do własnych poszukiwań!

Marcin HAUZER



## Zadania

Redaguje Mikołaj KORZYŃSKI

**F 669.** Pręt z jednej strony zakończony jest bardzo śliską powierzchnią mogącą poruszać się praktycznie bez tarcia, z drugiej powierzchnią szorstką, o dużym współczynniku tarcia statycznego. Opieramy go o ścianę raz częścią szorstką do góry, raz w dół (rys. 1). W której pozycji może on znajdować się w stanie równowagi i dlaczego?

Rozwiązanie na str. 16

**F 670.** Drabina składa się z dwóch jednakowych części połączonych przegubem działającym bez tarcia. Na jej lewą część, do  $3/4$  całkowitej wysokości drabiny, wchodzi człowiek. Z której strony lepiej podeprzeć drabinę zamocowanym klockiem, aby zapobiec „rozjechaniu się” drabiny z człowiekiem?

Rozwiązanie na str. 16

Redaguje Waldemar POMPE

**M 1135.** Danych jest 26 kolejnych liczb naturalnych. Okazało się, że suma pewnych dziesięciu z nich jest liczbą pierwszą. Wykazać, że suma pozostałych szesnastu liczb jest liczbą złożoną.


Rozwiązanie na str. 7

**M 1136.** Dany jest trójkąt ostrokątny  $ABC$ . Punkty  $D$  i  $E$  są rzutami prostokątnymi punktów  $A$  i  $B$ , odpowiednio, na proste  $BC$  i  $CA$  (rys. 2). Punkty  $P$  i  $Q$  są rzutami prostokątnymi, odpowiednio, punktów  $A$  i  $B$  na prostą  $DE$ . Dowieść, że  $PE = DQ$ .


Rozwiązanie na str. 2

**M 1137.** Na przyjęciu spotkało się  $n > 10$  osób. Okazało się, że wśród dowolnych dziesięciu z nich istnieją trzy, z których każda zna dwie z pozostałych. Wykazać, że spośród wszystkich osób na przyjęciu można wyłonić osiem tak, aby każda z pozostałych знаła przynajmniej jedną osobę z wybranej ósemki.

Rozwiązanie na str. 6



Rys. 1



Rys. 2