


Klub 44




Czołówka ligi zadaniowej **Klub 44 F** po uwzględnieniu ocen rozwiązań zadań 590 ($WT = 1,97$), 591 ($WT = 2,12$), 592 ($WT = 1,60$) i 593 ($WT = 3,40$) z numerów 1/2015 i 2/2015


| | | |
|----------------------|----------|------------|
| Tomasz Rudny | Warszawa | 37,68 |
| Jacek Konieczny | Poznań | 27,92 |
| Marian Łupieżowicz | Gliwice | 1 – 26,26 |
| Michał Koźlik | Gliwice | 3 – 24,44 |
| Ryszard Woźniak | Kraków | 22,51 |
| Bogusław Mikielawicz | Brodnica | 1 – 22,22 |
| Tomasz Wietecha | Tarnów | 10 – 17,69 |
| Krzysztof Magiera | Łosiów | 3 – 14,40 |
| Karol Łukanowski | Niemcz | 11,97 |
| Jacek Piotrowski | Rzeszów | 2 – 10,49 |



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

Liga zadaniowa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcji *Delty*

Skrót regulaminu

Każdy może nadsyłać rozwiązania zadań z numeru n w terminie do końca miesiąca $n + 2$. Szkice rozwiązań zamieszczamy w numerze $n + 4$. Można nadsyłać rozwiązania czterech, trzech, dwóch lub jednego zadania (każde na oddzielnej kartce), można to robić co miesiąc lub z dowolnymi przerwami. Rozwiązania zadań z matematyki i z fizyki należy przysyłać w oddzielnych kopertach, umieszczając na kopercie dopisek: **Klub 44 M** lub **Klub 44 F**. Oceniamy zadania w skali od 0 do 1 z dokładnością do 0,1. Ocenę mnożymy przez współczynnik trudności danego zadania: $WT = 4 - 3S/N$, gdzie S oznacza sumę ocen za rozwiązania tego zadania, a N – liczbę osób, które nadesłały rozwiązanie choćby jednego zadania z danego numeru w danej konkurencji (**M** lub **F**) – i tyle punktów otrzymuje nadsyłający. Po zgromadzeniu 44 punktów, w dowolnym czasie i w którejkolwiek z dwóch konkurencji (**M** lub **F**), zostaje on członkiem **Klubu 44**, a nadwyżka punktów jest zaliczana do ponownego udziału. Trzykrotne członkostwo – to tytuł **Weterana**. Szczegółowy regulamin został wydrukowany w numerze 2/2002 oraz znajduje się na stronie deltami.edu.pl

Rozwiązania zadań z fizyki z numeru 4/2015

Redaguje **Elżbieta ZAWISTOWSKA**

Przypominamy treść zadań:

596. Od prostoliniowego fragmentu brzegu odpłynęły jednocześnie dwa statki A i B , które w chwili początkowej znajdowały się w odległości a . Statek A poruszał się po prostej prostopadłej do brzegu. Statek B przez cały czas trzymał kurs na statek A . Wartości prędkości obu statków były stałe i jednakowe. Jaka była odległość między statkami, gdy można było już uznać, że statek B zaczął płynąć za statkiem A ?

597. Trzy płytki metalowe o powierzchniach S ustawiono równolegle. Pierwsza naładowana jest ładunkiem Q , druga i trzecia połączone są drutem przewodzącym (rys. 1). Rozmiary liniowe płytek są dużo większe od odległości między nimi. Jaka siła działa na środkową płytkę?

596. Rozważmy sytuację przedstawioną na rysunku 2, gdy prędkość statku B tworzy z prostopadłą do brzegu kąt α . Statek B zbliża się do statku A z prędkością o wartości

$$v_{B/A} = v - v \cos \alpha.$$

Statek A oddala się od punktu C (rzut statku B na tor statku A) z prędkością o tej samej wartości. Zatem suma długości odcinków $|AB| + |AC|$ jest stała.

W chwili początkowej punkt A pokrywa się z punktem C , zatem suma ta wynosi a . W chwili, którą uznajemy za końcową, punkt B pokrywa się z punktem C z dowolnie ustaloną dokładnością (tzn. odległość między punktami B i C dąży do zera w miarę upływu czasu), czyli

$$|AB| = |AC|, \quad 2|AB| = a,$$

szukana odległość między statkami wynosi $\frac{a}{2}$.

597. Natężenie pola elektrycznego między płytkami 2 i 3 wynosi zero, bo są one połączone przewodnikiem i ich potencjały są jednakowe. Ze względu na duże rozmiary płytek w porównaniu z odległościami między nimi możemy przyjąć, że pole elektryczne wytwarzane przez płytkę jest takie, jak od nieskończonej powierzchni. Z prawa Gaussa natężenie pola od pierwszej płytki wynosi

$$E_1 = \frac{Q}{2\epsilon_0 S},$$

natężenie od drugiej i trzeciej płytki w obszarze między nimi

$$E_2 = \frac{Q_1}{\epsilon_0 S},$$

gdzie Q_1 oznacza ładunek na trzeciej płytce równy co do wartości i o przeciwnym znaku niż ładunek na płytce drugiej. Wektory E_1 i E_2 w obszarze między płytkami mają przeciwne zwroty i jednakowe wartości. Stąd

$$Q_1 = \frac{Q}{2}.$$


Płytkę środkową jest przyciągana przez płytki zewnętrzne siłami

$$F_1 = Q_1 E_1 = \frac{Q^2}{4\epsilon_0 S}, \quad F_2 = \frac{Q_1 E_2}{2} = \frac{Q^2}{8\epsilon_0 S}.$$

Wypadkowa siła skierowana jest do pierwszej płytki i ma wartość


$$F = \frac{Q^2}{8\epsilon_0 S}.$$

Klub 44



Czołówka ligi zadaniowej **Klub 44 M** po uwzględnieniu ocen rozwiązań zadań 693 ($WT = 1,72$) i 694 ($WT = 2,95$) z numeru 1/2015

| | | |
|--------------------|----------|-------|
| Marek Spychała | Warszawa | 42,75 |
| Wojciech Tobiś | Praszka | 42,44 |
| Janusz Olszewski | Warszawa | 40,50 |
| Łukasz Garncarek | Opole | 37,98 |
| Grzegorz Karpowicz | Wrocław | 37,05 |
| Krzysztof Maziarz | Kraków | 35,37 |
| Paweł Najman | Kraków | 33,64 |
| Jędrzej Garnek | Poznań | 33,12 |



Rozwiązanie zadania F 886. Okres wahadła $T = N/f$, a stąd jego długość $L = gN^2/4\pi^2 f^2 \approx 1$ m. Długość obrazu wahadła jest więc znacznie mniejsza od jego długości rzeczywistej ($L' \ll L$). Oznacza to, że poszukiwana odległość D od kamery do wahadła wielokrotnie przewyższa ogniskową obiektywu ($D \gg F$). Stąd z kolei wynika, że obraz wahadła znajduje się bardzo blisko ogniska obiektywu, a więc odległość od obiektywu do kliszy, na której powstaje obraz, jest w przybliżeniu równa F . Stąd wynika, że $L/D \approx L'/F$, czyli

$$D \approx FL/L' = FgN^2/4\pi^2 f^2 L' \approx 7 \text{ m.}$$

Rozwiązania zadań z matematyki z numeru 4/2015

Redaguje Marcin E. KUCZMA

Przypominamy treść zadań:

699. Cztery różne punkty na płaszczyźnie wyznaczają sześć odcinków. Załóżmy, że trzy spośród tych odcinków mają jednakową długość a , zaś pozostałe trzy mają jednakową długość b , przy czym $a < b$. Wyznaczyć wszystkie możliwe wartości stosunku b/a .

700. Czy dla każdej funkcji $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, spełniającej warunek $g(1) = 1$, istnieje funkcja $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, spełniająca warunki $f(n) \geq g(n)$ dla $n \in \mathbb{N}$ oraz $f(mn) = f(m)f(n)$ dla każdej pary liczb względnie pierwszych $m, n \in \mathbb{N}$? (\mathbb{N} to zbiór wszystkich liczb całkowitych dodatnich).

699. Jeżeli trzy odcinki jednakowej długości tworzą trójkąt, to pozostałe trzy odcinki (też jednakowej długości) spotykają się w pozostałym z czterech danych punktów, który wobec tego musi być środkiem owego trójkąta równobocznego. W tym przypadku $b/a = \sqrt{3}$, i jest to jedna z możliwych wartości rozpatrywanego stosunku. Dalej przyjmijmy, że nie pojawia się trójkąt równoboczny. Trzy odcinki długości a tworzą wówczas łamaną (nie zamkniętą), i tak samo trzy odcinki długości b . Można tak ustalić oznaczenia A, B, C, D danych punktów, by

$$|AB| = |BC| = |CD| = a, \quad |BD| = |DA| = |AC| = b.$$

W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AC jest dłuższa niż ramiona. W trójkącie równoramiennym ABD podstawa AB jest krótsza niż ramiona. Zatem $|\sphericalangle BAC| < 60^\circ < |\sphericalangle BAD|$.

Odcinek AD jest wspólnym bokiem przystających trójkątów równoramiennych ABD oraz ACD (o podstawach AB, CD). Te trójkąty muszą być położone symetrycznie – albo względem środka odcinka AD , albo względem symetralnej tego odcinka. W pierwszym z tych przypadków powstałby równoległobok $ABDC$; to jednak nie jest możliwe, skoro kąt BAC jest mniejszy od kąta BAD .

W drugim przypadku tworzy się trapez równoramienny $ABCD$ o podstawach AD (dłuższej) i BC (krótszej). Półproste AB^{\rightarrow} i DC^{\rightarrow} przecinają się w punkcie, który nazwiemy K . Trójkąty równoramienne ADB i BKC mają równe podstawy ($|AB| = |BC| = a$) i równe kąty przy podstawie ($|\sphericalangle BAD| = |\sphericalangle CBK|$) – są więc przystające. Stąd $|BK| = |AD| = b$. Trójkąt BKC jest ponadto podobny do AKD . Otrzymujemy proporcję

$$\frac{|AD|}{|BC|} = \frac{|AK|}{|BK|}, \quad \text{czyli} \quad \frac{b}{a} = \frac{a+b}{b}.$$

Stosunek $\lambda = b/a$ spełnia zatem równanie $\lambda = \lambda^{-1} + 1$, którego jedynym dodatnim pierwiastkiem jest $\lambda = (1 + \sqrt{5})/2$. Realizację tej wartości uzyskujemy, biorąc jako A, B, C, D cztery wierzchołki pięciokąta foremnego.

Stąd odpowiedź: możliwymi wartościami stosunku b/a są liczby $\sqrt{3}$ oraz $(1 + \sqrt{5})/2$.

700. Tak, dla każdej funkcji g łatwo wskazać funkcję f o wymaganych własnościach. Niech (a_k) będzie rosnącym ciągiem wszystkich potęg liczb pierwszych:

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) = (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 16, \dots) = (2, 3, 2^2, 5, \dots).$$

Funkcja f (o własności $f(mn) = f(m)f(n)$ gdy $\text{nwd}(m, n) = 1$) jest wyznaczona przez ciąg wartości $f(a_k)$; zaś podany warunek mnożliwości nie stawia na owe wartości żadnych ograniczeń. Wobec tego konstruujemy taki ciąg indukcyjnie. Niech $f(a_1)$ będzie dowolną liczbą naturalną większą od $g(a_1)$.

Założmy, że liczby $f(a_1), \dots, f(a_{k-1})$ zostały już określone. Patrzymy na zbiór wszystkich liczb postaci $g(s)$, gdzie s jest iloczynem różnych liczb ze zbioru $\{a_1, \dots, a_k\}$. Określamy $f(a_k)$ jako dowolną liczbę naturalną większą od wszystkich takich liczb $g(s)$.

Wybrany ciąg wartości $f(a_k)$, wraz z warunkiem mnożliwości, jednoznacznie generuje funkcję $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Spełnia ona także pozostałe z zadanych warunków; jeśli bowiem liczba $n \in \mathbb{N}$ zostanie zapisana jako iloczyn $n = a_{i_1} \dots a_{i_r}$, gdzie $i_1 < \dots < i_r$, wówczas

$$f(n) = f(a_{i_1}) \dots f(a_{i_r}) \geq f(a_{i_r}) > g(a_{i_1} \dots a_{i_r}) = g(n).$$