



## LXVI Olimpiada Matematyczna

W LXVI Olimpiadzie Matematycznej uczestniczyło 895 uczniów, więc aż o 272 osoby mniej niż rok wcześniej, do zawodów stopnia drugiego zakwalifikowano 409 uczniów, a do zawodów stopnia trzeciego – 126 uczniów. Wiele osób, w tym niżej podpisany, uznało, że zadania domowe były za trudne i nie zachęcały uczniów spoza szkół o dużych tradycjach olimpijskich (a raczej uczniów nauczycieli, którzy uczą matematyki, a nie tylko przygotowują do zdania matury) do startowania w tych zawodach.

Niektóre okręgi obniżyły zwyczajowe progi dopuszczenia do zawodów drugiego stopnia, ale i tak zakwalifikowano do nich o 98 osób mniej niż rok wcześniej. Komisja zadaniowa OM starała się wziąć pod uwagę te czynniki. Jako członek tego gremium uznaję, że zadania na zawody drugiego i trzeciego stopnia nie były za trudne.

Do finału dopuściliśmy tych uczniów, którzy uzyskali co najmniej 19 punktów, co oznacza rozwiązanie 3,5 zadania (np.  $2 \cdot 6 + 5 + 2$ ). Obniżenie progu do 18 punktów oznaczałoby dopuszczenie dodatkowych 22 osób do finału.

Zadania finałowe dobrze rozróżniły czołówkę: tym razem ustalając składy reprezentacji Polski na Olimpiadę Międzynarodową i inne zawody, nie musieliśmy korzystać z wyników zawodów okręgowych. Tylko 9 finalistów (około 7%) nie rozwiązało żadnego zadania (w drugim stopniu było to 30 osób (około 7,4%)).

Liczby zadań ocenionych na 6 lub 5 punktów w drugim stopniu: pierwsze – 330, drugie – 112, trzecie – 154, czwarte – 217, piąte – 141 i szóste – 30.

Liczby zadań finałowych ocenionych na 6 lub 5 punktów: pierwsze – 100, drugie – 33, trzecie – 21, czwarte – 50, piąte – 19, a szóste – 26.

**Najtrudniejsze z zadań finałowych** było zadanie piąte, z planimetrii, choć spodziewaliśmy się, że będzie nim zadanie trzecie, z kombinatoryki. Co więcej, w czasie omawiania rozwiązań tuż po zawodach dwóch byłych olimpijczyków przedstawiło swe rozwiązania tego zadania wykorzystujące wiele twierdzeń, często nieznanymi większości słuchających.

Oto treść zadania: *Dowieść, że przekątne wypukłego czworokąta są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy wewnątrz tego czworokąta znajduje się punkt, którego rzuty prostopadłe na boki czworokąta są wierzchołkami prostokąta.*

Podam jego „antygeometryczne” rozwiązanie. Drobne luki Czytelnicy wypełnią, jeśli zechcą, sami.

Załóżmy, że rzuty punktu  $P$  na boki czworokąta  $ABCD$  tworzą prostokąt i oberzmy układ współrzędnych tak, by  $P = (0, 0)$  był jego początkiem, a osie były równoległe, odpowiednio, do boków prostokąta. Niech rzutem  $P$  na  $AB$  będzie punkt  $Q = (a, b)$ , na bok  $BC$  – punkt  $R = (c, b)$ , na bok  $CD$  – punkt  $S = (c, d)$  a na bok  $DA$  – punkt  $T = (a, d)$ , przy czym  $a, b > 0 > c, d$ . Prosta  $AB$  jest prostopadła do wektora  $(a, b)$ , więc ma równanie  $ax + by = a^2 + b^2$ . Podobnie równaniami prostych  $BC$ ,  $CD$  i  $DA$  są odpowiednio  $cx + by = c^2 + b^2$ ,  $cx + dy = c^2 + d^2$  i  $ax + dy = a^2 + d^2$ .

Proste  $ax + by = a^2 + b^2$  i  $cx + by = c^2 + b^2$  przecinają się w punkcie  $(a + c, \frac{b^2 - ac}{b})$ , więc  $B = (a + c, \frac{b^2 - ac}{b})$ . Podobnie  $C = (\frac{c^2 - bd}{c}, b + d)$ ,  $D = (a + c, \frac{d^2 - ac}{d})$  i  $A = (\frac{a^2 - bd}{a}, b + d)$ . Prosta  $AC$  jest równoległa do osi  $OX$ , a prosta  $BD$  – do osi  $OY$ , więc przekątne prostokąta  $ABCD$  są prostopadłe.

Czysto geometryczne rozwiązanie można obejrzeć na stronie [http://www.om.edu.pl/sites/default/files/zadania/om/om66\\_3r.pdf](http://www.om.edu.pl/sites/default/files/zadania/om/om66_3r.pdf).

Jedyną trudnością w tym rozwiązaniu jest wybranie „dobrego” układu współrzędnych.

Z kolei gdy czworokąt  $ABCD$  ma prostopadłe przekątne, możemy umieścić go tak, by miał wierzchołki na osiach:  $A = (a, 0)$ ,  $B = (0, b)$ ,  $C = (c, 0)$  i  $D = (0, d)$ . Z już udowodnionego wiemy, że jeśli rzuty pewnego punktu tworzą prostokąt, ma on boki równoległe do osi.

Równaniem prostej  $AB$  jest  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ , bo spełniają je współrzędne punktów  $A$  i  $B$ . Analogicznie równaniami prostych  $BC$ ,  $CD$  i  $DA$  są odpowiednio  $\frac{x}{c} + \frac{y}{b} = 1$ ,  $\frac{x}{c} + \frac{y}{d} = 1$  i  $\frac{x}{a} + \frac{y}{d} = 1$ . Niech  $Q_t = (t, b(1 - \frac{t}{a}))$ ,  $R_t = (\frac{ct}{a}, b(1 - \frac{t}{a}))$ ,  $S_t = (\frac{ct}{a}, d(1 - \frac{t}{a}))$ ,  $T_t = (t, d(1 - \frac{t}{a}))$  – wyliczone zostały kolejno współrzędne tych punktów w zależności od pierwszej współrzędnej punktu  $Q_t$  oznaczonej literą  $t$  tak, by punkt  $Q_t$  leżał na prostej  $AB$ , punkt  $R_t$  – na  $BC$ , punkt  $S_t$  – na  $CD$ , punkt  $T_t$  – na  $DA$ . Znajdziemy taki punkt  $P_d = (p, q)$ , że odcinek  $P_d Q_t$  będzie prostopadły do prostej  $AB$ , a odcinek  $P_d R_t$  – prostopadły do prostej  $BC$ . Spełnione mają być równości  $(p - t) \cdot \frac{1}{b} - (q - b + \frac{bt}{a}) \cdot \frac{1}{a} = 0$  oraz  $(p - \frac{ct}{a}) \cdot \frac{1}{b} - (q - b + \frac{bt}{a}) \cdot \frac{1}{c} = 0$ . Wynika z nich, że  $p = t \frac{c+a}{a}$  i  $q = b + t \frac{ac - b^2}{ab}$ . W taki sam sposób znajdujemy taki punkt  $P_g = (\tilde{p}, \tilde{q})$ , że  $P_g T_t \perp AD$  i  $P_g S_t \perp CD$ :  $\tilde{p} = t \frac{c+a}{a} = p$  i  $\tilde{q} = d + t \frac{ac - d^2}{ad}$ . Obliczymy  $t$  z równania  $q = \tilde{q}$ :

$$d - b = t \frac{(ac - b^2)d - (ac - d^2)b}{abd} = t \frac{(ac + bd)(d - b)}{abd},$$

zatem  $t = \frac{abd}{ac + bd}$ . Dla tego  $t$  otrzymujemy

$$P := P_d = P_g = (\frac{bd(a+c)}{ac+bd}, \frac{ac(b+d)}{ac+bd}).$$

Rzutami punktu  $P$  na proste  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  i  $DA$  są punkty  $Q := Q_t = (\frac{abd}{ac+bd}, \frac{abc}{ac+bd})$ ,  $R := R_t = (\frac{bcd}{ac+bd}, \frac{abc}{ac+bd})$ ,  $S := S_t = (\frac{bcd}{ac+bd}, \frac{acd}{ac+bd})$ ,  $T := T_t = (\frac{abd}{ac+bd}, \frac{acd}{ac+bd})$ .