


### Skrót regulaminu

Każdy może nadsyłać rozwiązania zadań z numeru  $n$  w terminie do końca miesiąca  $n + 2$ . Szkice rozwiązań zamieszczamy w numerze  $n + 4$ . Można nadsyłać rozwiązania czterech, trzech, dwóch lub jednego zadania (każde na oddzielnej kartce), można to robić co miesiąc lub z dowolnymi przerwami. Rozwiązania zadań z matematyki i z fizyki należy przysyłać w oddzielnych kopertach, umieszczając na kopercie dopisek: **Klub 44 M** lub **Klub 44 F**. Można je przysyłać również pocztą elektroniczną pod adresem [delta@mimuw.edu.pl](mailto:delta@mimuw.edu.pl) (preferujemy pliki pdf). Oceniamy zadania w skali od 0 do 1 z dokładnością do 0,1. Ocenę mnożymy przez współczynnik trudności danego zadania:  $WT = 4 - 3S/N$ , gdzie  $S$  oznacza sumę ocen za rozwiązania tego zadania, a  $N$  – liczbę osób, które nadesłały rozwiązanie choćby jednego zadania z danego numeru w danej konkurencji (**M** lub **F**) – i tyle punktów otrzymuje nadsyłający. Po zgromadzeniu 44 punktów, w dowolnym czasie i w którejkolwiek z dwóch konkurencji (**M** lub **F**), zostaje on członkiem **Klubu 44**, a nadwyżka punktów jest zaliczana do ponownego udziału. Trzykrotne członkostwo – to tytuł **Weterana**. Szczegółowy regulamin został wydrukowany w numerze 2/2002 oraz znajduje się na stronie [deltami.edu.pl](http://deltami.edu.pl)

### Zadania z fizyki nr 662, 663


Redaguje *Elżbieta ZAWISTOWSKA*




Termin nadsyłania rozwiązań: 30 XI 2018




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

**662.** Na poziomej płaszczyźnie leżą dwa klocki o jednakowych masach  $m$ , połączone nieważką sprężyną (rys. 1). Współczynnik tarcia klocków o płaszczyznę wynosi  $\mu$ . Napięcie sprężyny ma wartość  $N$ . Jaką maksymalną stałą siłę  $F$  można przyłożyć do jednego z klocków, aby drugi nie ruszył z miejsca?

**663.** W kondensatorze płaskim jedna okładka jest nieruchoma, a druga może poruszać się bez tarcia i jest połączona ze ścianą za pomocą sprężyny o współczynniku sprężystości  $k$  (rys. 2). Pole powierzchni każdej okładki wynosi  $S$ , początkowa odległość między nimi  $d$ . Okładki podłączono do źródła napięcia stałego. Przy jakiej maksymalnej wartości tego napięcia okładki nie zetkną się, jeżeli są stale równoległe względem siebie?

### Rozwiązania zadań z fizyki z numeru 5/2018

Przypominamy treść zadań:

**658.** Kulka o masie  $m_2$  leży na nieważkiej podstawce (rys. 3). Podstawka ma kształt prostokątnościenu połączonego z dwoma stykającymi się klinami o kątach nachylenia  $\alpha$ . Nie ma tarcia między podłożem a podstawką. Na prawym klinie położono kulkę o masie  $m_1$  i puszczono swobodnie. Jaki warunek musi być spełniony, aby kulka o masie  $m_2$  zaczęła w wyniku tego wsuwać się na lewy klin? Między kulkami a podstawką również nie ma tarcia.

**659.** Nieprzewodząca cienka płytką kwadratowa o boku  $d$  jest równomiernie naładowana ładunkiem  $Q$ . Na osi symetrii płytki prostopadłej do jej płaszczyzny, w odległości  $\frac{d}{2}$  od płytki, umieszczono ładunek punktowy  $q$ . Znaleźć wartość siły elektrostatycznej działającej na ten ładunek.

**658.** Kulka o masie  $m_2$  zacznie wsuwać się na lewy klin, gdy będzie wystarczająco lekka. Rozważmy masę graniczną  $m_2 = m_0$ , gdy kulka jeszcze się nie wsuwa, ale już nie naciska na prawy klin. Na rysunku 4 przedstawiono siły działające w tym granicznym przypadku na obie kulki. Siła reakcji  $R_2$  jest prostopadła do lewego klina. Ponieważ podstawka jest nieważką, składowe poziome siły reakcji, działających na kulki, równoważą się  $R_2 \sin \alpha - R_1 \sin \alpha = 0$ , stąd  $R_1 = R_2$ . Przyspieszenia obu kulek w kierunku prostopadłym do prawego klina są jednakowe (i równe przyspieszeniu podstawki w tym kierunku)

$$\frac{m_1 g \cos \alpha - R_1}{m_1} = \frac{m_0 g \cos \alpha - R_2 \cos 2\alpha}{m_0},$$


stąd  $m_0 = m_1 \cos 2\alpha$ . Dolna kulka będzie wsuwać się na lewy klin przy spełnionym warunku  $m_2 < m_1 \cos 2\alpha$ .

**659.** Siła działająca na ładunek równa jest co do wartości sile, jaką ładunek działa na płytkę. Ładunek znajduje się w środku sześcianu, którego jedną ze ścian jest płytkę. Zgodnie z prawem Gaussa strumień pola elektrycznego wytwarzanego przez ładunek  $q$  przez powierzchnię tego sześcianu wynosi  $\phi = \frac{q}{\epsilon_0}$ , gdzie  $\epsilon_0$  jest przenikalnością elektryczną próżni. Strumień pola przez powierzchnię płytki jest równy

$$\phi_1 = \frac{q}{(6\epsilon_0)} = \sum_i E_{i\perp} S_i,$$

gdzie  $S_i$  jest elementem powierzchni płytki, a  $E_{i\perp}$  składową wektora natężenia pola elektrycznego prostopadłą do płytki w miejscu, w którym znajduje się  $i$ -ty element powierzchni. Gęstość powierzchniowa ładunku płytki wynosi  $\frac{Q}{d^2}$ , szukana wartość siły działającej na płytkę dana jest wzorem

$$F = \frac{|qQ|}{6\epsilon_0 d^2}.$$



Termin nadsyłania rozwiązań: 30 XI 2018

## Zadania z matematyki nr 765, 766

Redaguje Marcin E. KUCZMA

**765.** Czworokąt  $ABCD$  jest wpisany w okrąg. Jego najmniejszy kąt wewnętrzny ma wierzchołek  $A$ . Zakładamy, że proste  $AD$  i  $BC$  przecinają się w punkcie  $P$ , zaś proste  $AB$  i  $DC$  przecinają się w punkcie  $Q$ , przy czym  $AP \perp PQ$ . Niech  $M$  będzie środkiem przekątnej  $BD$ . Wykazać, że  $PM \perp AB$ .

**766.** Znaleźć liczbę rzeczywistą  $M > 5/2$  taką, że dla dowolnych liczb dodatnich  $a, b, c, d, e$  zachodzi nierówność

$$\sqrt[5]{\frac{a}{b+c}} + \sqrt[5]{\frac{b}{c+d}} + \sqrt[5]{\frac{c}{d+e}} + \sqrt[5]{\frac{d}{e+a}} + \sqrt[5]{\frac{e}{a+b}} \geq M.$$

Im większa liczba  $M$ , tym lepsze rozwiązanie.

Zadanie 766 zaproponował pan Piotr Kumor z Olsztyna.

## Rozwiązania zadań z matematyki z numeru 5/2018

Przypominamy treść zadań:

**761.** Trójkąt  $ABC$  (nie prostokątny) jest wpisany w okrąg o średnicy  $AD$ . Punkt  $E$  jest symetryczny do  $A$  względem środka boku  $BC$ . Dowieść, że okręgi opisane na trójkątach  $ABC$  i  $BDE$  mają równe promienie.

**762.** Rozważamy liczby naturalne  $n \geq 2$ .

(a) Udowodnić, że jeśli liczba  $2^n - 1$  jest bezkwadratowa, to liczby  $n$  oraz  $2^n - 1$  są względnie pierwsze.

(b) Pokazać, że nie zachodzi implikacja odwrotna.

**761.** Czworokąt  $ABEC$  jest równoległobokiem. Niech prosta  $EC$  przecina okrąg, opisany na trójkącie  $ABC$ , w punktach  $C$  i  $F$  (gdy jest styczna, przyjmujemy  $F = C$ ). Powstaje trapez równoramienny  $ABCF$  lub  $ABFC$  (gdy  $F = C$  – trójkąt równoramienny). W każdym przypadku  $|BE| = |AC| = |BF|$ .

Trójkąt  $ABC$  z założenia nie jest prostokątny, więc żaden jego bok nie pokrywa się ze średnicą  $AD$ , na której oparty jest kąt prosty  $ABD$ ; a ponieważ  $AB \parallel CE$ , zatem  $BD \perp CE$ . To znaczy, że w trójkącie równoramiennym  $EBF$  prosta  $BD$  jest symetralną boku  $EF$ . W konsekwencji trójkąt  $BDE$  jest względem niej symetryczny do trójkąta  $BDF$ . Okręgi opisane na tych trójkątach są przystające; to już teza, bo drugi z tych okręgów jest też opisany na trójkącie  $ABC$ .


**762.** (a) Przypuśćmy, że liczby  $n$  oraz  $2^n - 1$  mają wspólny dzielnik pierwszy  $p$  (jasne, że  $p > 2$ ). Wykażemy, że wówczas liczba  $2^n - 1$  dzieli się przez  $p^2$  (nie jest więc bezkwadratowa). Zgodnie z małym twierdzeniem Fermata,  $2 \equiv 2^p \pmod{p}$ . Podnosimy tę kongruencję stronami do potęgi  $n/p$ , otrzymując  $2^{n/p} \equiv 2^n \equiv 1 \pmod{p}$ . Zatem  $2^{n/p} = kp + 1$  dla pewnej liczby całkowitej  $k$ . Stąd

$$2^n = (1 + kp)^p = 1 + \binom{p}{1}kp + \binom{p}{2}(kp)^2 + \dots + \binom{p}{p}(kp)^p,$$

czyli  $2^n \equiv 1 \pmod{p^2}$ ; a to była nasza teza.

(b) Przykład pokazujący, że nie zachodzi implikacja odwrotna, nie tak łatwo znaleźć (mała szansa, że trafimy, zwyczajnie próbując – bez komputera ciężko). Prosty program, który dla zadanej liczby pierwszej  $p$  kontroluje dwie końcowe cyfry rozwinięcia (przy podstawie  $p$ ) kolejnych potęg dwójki, pozwala znaleźć moment powtórzenia końcówki 01, czyli wykładnik  $n$ , dla którego  $2^n \equiv (** \dots **01)_p \equiv 1 \pmod{p^2}$ . Powtarzamy tę procedurę dla kolejnych liczb pierwszych  $p$ ; warto przy tym, dla oszczędności czasu, ograniczyć zakres wykładnika, np. do  $n < 1000$ . W ten sposób szybko znajdujemy parę  $p = 127$ ,  $n = 889$ ; nie jest ona jednak szukanym kontrprzykładem, bowiem dla tej pary zachodzą związki  $n = 7p$ ,  $2^7 \equiv 1 \pmod{p}$ , z których nietrudno wynika, że liczby  $n$  i  $2^n - 1$  nie są względnie pierwsze.

Następna znaleziona para  $p = 1093$ ,  $n = 364$  jest już dobra: gdyby liczby  $n = 4 \cdot 7 \cdot 13$  oraz  $2^n - 1$  nie były względnie pierwsze, ta ostatnia musiałaby się dzielić przez 7 lub 13; ale minimalne wykładniki  $\alpha, \beta$ , dla których  $2^\alpha \equiv 1 \pmod{7}$ ,  $2^\beta \equiv 1 \pmod{13}$ , to  $\alpha = 3$ ,  $\beta = 12$ , więc wykładnik  $n$  musiałby się dzielić przez 3; a tak nie jest. Skoro zaś ta para została wygenerowana przez algorytm, zapewniający podzielność  $2^n - 1$  przez  $p^2$ , zatem liczba  $2^{364} - 1$  nie jest bezkwadratowa.



Czołówka ligi zadaniowej **Klub 44 F**  
po uwzględnieniu ocen rozwiązań zadań  
654 (WT = 2,05), 655 (WT = 2,90)  
z numeru 3/2018

Tomasz Wietecha	Tarnów	44+3,92
Marian Łupieżowicz	Gliwice	41,20
Tomasz Rudny	Gliwice	39,04
Jacek Konieczny	Poznań	29,80
Ryszard Woźniak	Kraków	28,77
Krzysztof Magiera	Łosiów	28,70
Karol Łukanowski	Niemcz	23,85
Aleksander Surma	Myszków	20,28
Michał Koźlik	Poznań	19,20
Jan Zambrzycki	Białystok	17,37

Pan Tomasz Wietecha po raz 13  
przekroczył granicę 44 punktów.  
Gratulujemy!

Czołówka ligi zadaniowej **Klub 44 M**  
po uwzględnieniu ocen rozwiązań zadań  
755 (WT = 1,91) i 756 (WT = 1,56)  
z numeru 2/2018

Tomasz Choczewski	Szczecin	40,78
Franciszek S. Sikorski	Warszawa	39,86
Tomasz Wietecha	Tarnów	38,19
Michał Miodek	Warszawa	34,34
Krzysztof Kamiński	Pabianice	34,29
Paweł Kubit	Kraków	32,77
Michał Koźlik	Gliwice	32,23
Janusz Olszewski	Warszawa	32,15
Piotr Kumor	Olsztyn	31,69