



Zera zmieniają jednostkę w miliony

Bartłomiej BZDEGA

Liczbę całkowitą dodatnią $(k + 1)$ -cyfrową n możemy zapisać w postaci

$$n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0} = a_0 + a_1 \cdot 10 + a_2 \cdot 10^2 + \dots + a_k \cdot 10^k$$

(kreska nad wyrażeniem informuje, iż nie jest to po prostu mnożenie). Liczbę n możemy oszacować, znając jej pierwszą cyfrę oraz liczbę cyfr. Zachodzą oczywiste nierówności:

$$a_k \cdot 10^k \leq n < (a_k + 1) \cdot 10^k,$$

z których warto skorzystać w zadaniach 1, 3, 9 i 10.

Przez $S(n)$ oznaczamy sumę cyfr liczby n . Zauważmy, że liczba

$$n - S(n) = 9a_1 + 99a_2 + 999a_3 + \dots + 99 \dots 9a_k$$

dzieli się przez 9, zatem suma cyfr liczby naturalnej daje taką samą resztę z dzielenia przez 9, co ta liczba. Tego faktu używamy w zadaniach 1, 2, 4, 5 i 9.

Dzięki algorytmowi pisemnego dodawania mamy nierówność

$$S(m + n) \leq S(m) + S(n),$$

która jest pomocna w zadaniach 6, 7 i 8.

Na koniec przypomnimy o pewnej własności dzielenia z resztą, która jest w poniższych zadaniach pomocna: iloczyn liczb całkowitych daje taką samą resztę z dzielenia przez d , co iloczyn ich reszt z dzielenia przez d . Dowód pozostawiamy Czytelnikowi.

Zadania. (W każdym zadaniu $S(n)$ oznacza sumę cyfr liczby n .)

- Rozważmy wszystkie liczby siedmiocyfrowe, w których każda z cyfr $1, 2, \dots, 7$ występuje dokładnie raz. Udowodnić, że żadna z tych liczb nie jest dzielnikiem innej.
- Spośród liczb siedmiocyfrowych określonych w poprzednim zadaniu wybierzmy trzy, niekoniecznie różne. Czy ich suma może być kwadratem liczby naturalnej?
- W zapisie dziesiętnym pewnej dodatniej liczby całkowitej n nie występuje żadna z cyfr $1, 2, 9$. Udowodnić, że w zapisie dziesiętnym liczby $3n$ występuje co najmniej jedna z tych cyfr.
- W zapisie dziesiętnym liczby 2^{29} jest dziewięć cyfr, każda inna. Wiedząc to, bez obliczania 2^{29} wyznaczyć cyfrę, która w tej liczbie nie występuje.
- Dowieść, że $S(2n^2 + 3)$ nie jest kwadratem liczby całkowitej dla żadnego naturalnego n .
- Wykazać, że dla liczb całkowitych dodatnich m i n zachodzi nierówność $S(mn) \leq S(m)S(n)$.
- Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite dodatnie n , które spełniają równość $S(11^n) = 2^n$.
- Wyznaczyć najmniejszą oraz największą wartość wyrażenia $\frac{S(2n)}{S(n)}$ dla całkowitych dodatnich n .
- Rozstrzygnąć, czy istnieje liczba naturalna mniejsza od iloczynu swoich cyfr w zapisie dziesiętnym.
- Dla pewnego całkowitego dodatniego n liczby 2^n i 5^n mają taką samą pierwszą cyfrę. Wykazać, że tą cyfrą jest 3.
- Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele liczb naturalnych n , dla których $S(3^{n+1}) \leq S(3^n)$.

Wskazówki do zadań
 1. Wybierzmy liczbę a i b spośród danych w zadaniu. Mamy $\frac{a}{b} = \frac{a}{b}$, $\frac{a}{b} \in \{1, 2, \dots, 7\}$. Wówczas $a = bk$. Teraz trzeba zauważyć, że liczby a i b dają resztę 1 z dzielenia przez 9, co wyznacza $k = 1$.
 2. Suma trzech takich liczb daje resztę 3 z dzielenia przez 9. Wobec tego dzieli się ona przez 3, ale nie przez 9.
 3. Niech liczba z zadania będzie $(k + 1) \cdot 10^k$. Wystarczy teraz wykazać, że jeśli liczba $3n$ ma tyle samo cyfr co n , to jej pierwszą cyfrą jest 9, a jeśli ma o jedną cyfrę więcej, to jej pierwszą cyfrą jest 1 lub 2.
 4. Jeśli x jest brakującą cyfrą, to suma cyfr liczby $29x$ wynosi $1 + 2 + \dots + 9 - x$. Zauważmy, że liczba 2^0 daje resztę 1 z dzielenia przez 9, więc liczba 2^{29} daje resztę 5 z dzielenia przez 9. Wystarczy porównać obie reszty.
 5. Kwadrat liczby naturalnej może dawać resztę z dzielenia przez 9 równą 0, 1, 4 lub 7. Liczba $S(2n^2 + 3)$ daje taką samą resztę z dzielenia przez 9, co $2n^2 + 3$.
 6. Zapisując $n = \sum_{i=0}^k a_i \cdot 10^i$, otrzymamy $S(n) = \sum_{i=0}^k a_i$.
 7. Zapiszmy $c = 10^k$. Niech c będzie pierwszą cyfrą 2^n i 5^n . Zapiszmy $c \cdot 10^k > 2^n > (c + 1) \cdot 10^k$. Mnożąc te dwie nierówności, otrzymamy $c^2 \cdot 10^{k+1} > 10^{2k} > (c + 1)^2 \cdot 10^{k+1}$, z czego wnioskujemy, że $k + 1 = n - 1$ i w konsekwencji $c = 3$.
 8. Można użyć następujących oszacowań: $\frac{S(n)}{S(2n)} \leq \frac{S(n)}{S(n) + S(n)} = \frac{1}{2}$.
 9. Rozważmy liczbę $(k + 1)$ -cyfrową n o pierwszej cyfrze a . Iloczyn cyfr liczby n nie przekracza $a \cdot 9^k$, natomiast $n \geq a \cdot 10^k$. Taką liczbą nie istnieje.
 10. Niech c będzie pierwszą cyfrą 2^n i 5^n . Zapiszmy $c \cdot 10^k > 2^n > (c + 1) \cdot 10^k$. Mnożąc te dwie nierówności, otrzymamy $c^2 \cdot 10^{k+1} > 10^{2k} > (c + 1)^2 \cdot 10^{k+1}$, z czego wnioskujemy, że $k + 1 = n - 1$ i w konsekwencji $c = 3$.
 11. Przyjmijmy, że nierówność $S(3^{n+1}) \leq S(3^n)$ zachodzi tylko dla skończonej liczby n . Wtedy istnieją takie N , że dla wszystkich $n \geq N$ zachodzi $S(3^{n+1}) > S(3^n)$.
 Wskazówki do zadań