


# Dyskretny Darboux

Michał KIEZA



Każda funkcja ciągła określona na zbiorze liczb rzeczywistych ma własność Darboux, tzn. jeśli dla pewnych  $x$  i  $y$  mamy  $f(x) = a$  i  $f(y) = b$ , to w przedziale  $(x, y)$  są przyjmowane wszystkie wartości między  $a$  i  $b$ . Jest to bardzo skuteczne narzędzie do rozwiązywania wielu zadań z analizy matematycznej. Okazuje się, że podobny motyw możemy zaobserwować także w zadaniach dotyczących liczb całkowitych. Rozważmy bowiem taką funkcję  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , że  $|f(x+1) - f(x)| \leq 1$  dla każdego  $x \in \mathbb{Z}$ . Ma ona własność analogiczną do wcześniej opisanej własności Darboux, tzn. jeśli dla pewnych  $x$  i  $y$  mamy  $f(x) = a$  i  $f(y) = b$ , to na zbiorze  $\{x+1, x+2, \dots, y-1\}$  są przyjmowane wszystkie całkowite wartości między  $a$  i  $b$ . Spróbujmy zobaczyć na przykładach, jak potężna może być powyższa obserwacja.

**Zadanie 1.** Dana jest dodatnia liczba całkowita  $n$ . Każdy element zbioru  $\{1, 2, 3, \dots, 6n\}$  pomalowano na biało albo na czarno, przy czym dokładnie  $4n$  elementów jest białych. Wykazać, że w tym zbiorze istnieje  $3n$  kolejnych liczb całkowitych, wśród których dokładnie  $2n$  liczb jest białych.

*Rozwiązanie.* Niech  $f(k)$  dla  $1 \leq k \leq 3n+1$  będzie liczbą elementów zbioru  $\{k, k+1, \dots, k+3n-1\}$  pomalowanych na biało. Zauważmy, że  $f(1) + f(3n+1)$  jest liczbą elementów zbioru  $\{1, 2, 3, \dots, 6n\}$  pomalowanych na biało, czyli  $f(1) + f(3n+1) = 4n$ . Jeśli  $f(1) = 2n$ , to teza zadania zachodzi. W przeciwnym razie  $f(1) < 2n$  albo  $f(1) > 2n$ . Przyjmijmy bez straty ogólności, że spełniony jest pierwszy przypadek (drugi jest analogiczny). Wtedy  $f(3n+1) > 2n$ . Jest jasne, że  $|f(k+1) - f(k)| \leq 1$ , zatem istnieje taka liczba  $1 < k < 3n+1$ , dla której mamy  $f(k) = 2n$ , co jest równoważne z tezą zadania.

**Zadanie 2.** Udowodnić, że istnieje 2020 kolejnych dodatnich liczb całkowitych, wśród których jest dokładnie 13 liczb pierwszych.

*Rozwiązanie.* Niech  $f(k)$  dla  $k \geq 1$  będzie liczbą liczb pierwszych w zbiorze  $\{k, k+1, \dots, k+2019\}$ . Wśród pierwszych 2020 liczb całkowitych dodatnich jest więcej niż 13 liczb pierwszych, zatem  $f(1) > 13$ . Zauważmy także, że wśród liczb  $2021! + 2, 2021! + 3, \dots, 2021! + 2021$  występują same liczby złożone, zatem  $f(2021! + 2) = 0$ . Oczywiście mamy  $|f(k+1) - f(k)| \leq 1$ , skąd wniosek, że istnieje taka liczba  $1 < k < 2021! + 2$ , dla której mamy  $f(k) = 13$ . To kończy rozwiązanie zadania.

**Zadanie 3.** Nauczyciel napisał na tablicy trójmian kwadratowy  $x^2 + 3x + 15$ . Następnie wszyscy uczniowie w klasie podchodzili kolejno do tablicy; każdy z nich zmniejszał albo zwiększał o jeden współczynnik przy  $x$  albo wyraz wolny trójmianu. Na koniec okazało się, że na tablicy widnieje trójmian  $x^2 + 13x + 5$ . Udowodnić, że w pewnym momencie na tablicy był napisany trójmian o pierwiastkach całkowitych.


*Rozwiązanie.* Niech  $f(k)$  będzie wartością danego trójmianu w punkcie  $x = -1$  po zmianie współczynników przez  $k$ -tego ucznia i niech  $f(0)$  będzie wartością w  $-1$  trójmianu napisanego przez nauczyciela. Zauważmy, że  $f(0) = 12$ , a  $f(n) = -7$  (gdzie  $n$  to numer ostatniego ucznia). Ponadto zachodzi nierówność  $|f(k+1) - f(k)| \leq 1$ . Rzeczywiście – jest to jasne, gdy zmieniamy wyraz wolny, zaś zmieniając o  $\pm 1$  wartość współczynnika przy  $x$ , dodajemy lub odejmujemy 1 do wartości wielomianu w  $-1$ . W takim razie istnieje takie  $1 \leq k < n$ , że  $f(k) = 0$ . Zatem w pewnym momencie na tablicy był napisany trójmian  $x^2 + ax + b$ , którego jednym z pierwiastków było  $-1$ ; ze wzorów Viète'a wnosimy, że drugim jego pierwiastkiem była liczba całkowita  $b$ .


Metoda rozwiązania kolejnego zadania będzie nieznacznie różniła się od poprzednich, gdyż tym razem nasza funkcja będzie skakała o 2, ale tylko po liczbach parzystych.

**Zadanie 4.** Dany jest wielokąt wypukły o parzystej liczbie boków. Każdy bok wielokąta ma długość 2 lub 3, przy czym liczba boków każdej z tych długości jest parzysta. Dowieść, że istnieją dwa wierzchołki wielokąta, które dzielą jego obwód na dwie części jednakowej długości.

*Rozwiązanie.* Niech liczba boków wielokąta będzie równa  $2n$ , a jego wierzchołkami będą kolejno  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{2n}$ . Dla  $i = 1, 2, \dots, 2n$  niech

$$f(i) = A_i A_{i+1} + A_{i+1} A_{i+2} + A_{i+2} A_{i+3} + \dots + A_{i+n-1} A_{i+n} - A_{i+n} A_{i+n+1} - A_{i+n+1} A_{i+n+2} - A_{i+n+2} A_{i+n+3} - \dots - A_{i+2n-1} A_i,$$





gdzie  $A_{k+2n} = A_k$  dla  $k = 1, 2, \dots, 2n - 1$ . Innymi słowy,  $f(i)$  jest różnicą długości części, na które dzieli obwód wielokąta punkty  $A_i$  oraz  $A_{i+n}$ . Ponieważ

$$f(i) = 2 \cdot (A_i A_{i+1} + A_{i+1} A_{i+2} + A_{i+2} A_{i+3} + \dots + A_{i+n-1} A_{i+n}) - \ell$$

(gdzie  $\ell$  jest obwodem danego wielokąta), to  $f(i)$  jest liczbą parzystą. Ponadto mamy

$$|f(i+1) - f(i)| = |2 \cdot A_{i+n} A_{i+n+1} - 2 \cdot A_i A_{i+1}| = 2 \cdot |A_{i+n} A_{i+n+1} - A_i A_{i+1}| \leq 2.$$

Zachodzi także równość  $f(i) = -f(i+n)$ . Stąd wynika, że ciąg liczb

$$f(1), f(2), \dots, f(n) \text{ oraz } f(n+1) = -f(1)$$

składa się z liczb parzystych, a jego kolejne wyrazy różnią się nie więcej niż o 2. Zatem istnieje takie  $i$ , że  $f(i) = 0$ , czyli punkty  $A_i$  oraz  $A_{i+n}$  dzielą obwód danego wielokąta na dwie części o jednakowej długości.

Na koniec proponujemy Czytelnikom dwa zadania do samodzielnego rozwiązania.

**Zadanie 5.** Niech  $n, p, q$  będą liczbami całkowitymi dodatnimi. Ciąg liczb całkowitych  $(x_0, x_1, \dots, x_n)$  spełnia warunki:

$$x_0 = x_n \text{ oraz } x_{i+1} - x_i \in \{p, -q\}$$

dla  $i = 0, 1, \dots, n-1$ . Udowodnić, że jeżeli  $n > p + q$ , to istnieją takie  $k, \ell$ , że  $k \neq \ell$  i  $\{k, \ell\} \neq \{0, n\}$  oraz  $x_k = x_\ell$ .

**Zadanie 6.** Dany jest wielokąt wypukły o parzystej liczbie boków. Każdy bok wielokąta ma długość 2 lub 3, przy czym liczba boków każdej z tych długości jest parzysta. Dowiedź, że istnieją dwa wierzchołki wielokąta, które dzielą jego obwód na dwie części, z których każda zawiera taką samą liczbę odcinków długości 2 i taką samą liczbę odcinków długości 3.



## Zadania

Przygotował Łukasz RAJKOWSKI

**M 1636.** Udowodnić, że nie istnieją takie nieparzyste liczby  $x, y, z$ , że

$$(x+y)^2 + (y+z)^2 = (z+x)^2.$$

Rozwiązanie na str. 2

**M 1637.** W międzyszkolnym turnieju gry w warcaby każda para uczestników z różnych szkół rozegrała jedną partię; jeśli uczestnicy pochodzili z tej samej szkoły, nie grali ze sobą. *Singlem* nazwiemy każdy mecz rozegrany przez uczestników tej samej płci, a *miksem* – przez uczestników płci przeciwnej. Na koniec turnieju okazało się, że liczba dziewczynek biorących udział w turnieju różni się o co najwyżej 1 od liczby chłopców. Podobnie, liczba rozegranych singli różniła się o co najwyżej 1 od liczby mikсів. Udowodnić, że liczba szkół, z których startowały różne liczby chłopców i dziewcząt, nie przekracza 3.

Rozwiązanie na str. 19

**M 1638.** Wielomian  $P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$  ma  $n$  pierwiastków rzeczywistych (licząc z krotnościami). Wiedząc, że  $a_{n-1} = -n$  i  $a_{n-2} = \frac{1}{2}n(n-1)$ , wyznaczyć  $a_i$  dla  $0 \leq i \leq n-3$ .

Rozwiązanie na str. 2

Przygotował Andrzej MAJHOFER

**F 999.** Jednorodnemu walcowi o masie  $m$  i promieniu  $r$  nadano prędkość kątową  $\omega_0$  wokół osi symetrii obrotowej i położono na poziomej podłodze. Przyspieszenie ziemskie wynosi  $g$ , a współczynnik tarcia kinetycznego między podłogą i powierzchnią walca wynosi  $\mu$ . Po jakim czasie  $\tau$  walec przestanie się ślizgać i zacznie się toczyć ze stałą prędkością kątową? Jaką pracę  $W$  wykona siła tarcia? Wskazówka: moment bezwładności  $I$  jednorodnego walca, o promieniu  $r$  i masie  $m$ , wokół jego osi symetrii wynosi:  $I = mr^2/2$ .

Rozwiązanie na str. 14

**F 1000.** Przeciętne oko ludzkie rejestruje światło o długościach fali  $\lambda$  mieszczących się w zakresie  $380 \text{ nm} < \lambda < 740 \text{ nm}$ . Ile linii widma wodoru człowiek może zaobserwować bezpośrednio? Stała Plancka wynosi  $h = 4,136 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$ , prędkość światła  $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ , a stała Rydberga  $R = 13,606 \text{ eV}$ .

Rozwiązanie na str. 15

