



# Kto z kim przystaje...

Bartłomiej BZDEGA

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Rozważmy trójkąt  $ABC$ , w którym

$$|BC| = a, \quad |CA| = b, \quad |AB| = c,$$

$$|\sphericalangle CAB| = \alpha, \quad |\sphericalangle ABC| = \beta, \quad |\sphericalangle BCA| = \gamma.$$

Niech  $A'B'C'$  będzie trójkątem z analogicznie przyjętymi oznaczeniami  $a', b', c', \alpha', \beta', \gamma'$ .

Trójkąty  $ABC$  i  $A'B'C'$  nazywamy *przystającymi*, jeśli  $a = a', b = b', c = c', \alpha = \alpha', \beta = \beta', \gamma = \gamma'$ . Piszemy wówczas  $\triangle ABC \equiv \triangle A'B'C'$ . Dobrze jest w tym zapisie zwracać uwagę na kolejność wierzchołków – tutaj  $A$  i  $A'$  wymienione są jako pierwsze, bo  $a = a'$  i  $\alpha = \alpha'$ ; z analogicznego powodu  $B$  i  $B'$  są jako drugie, a  $C$  i  $C'$  jako trzecie. Zapis  $\triangle ABC \equiv \triangle B'C'A'$  nie jest błędny, ale trudniej odczytywać z niego informacje o tym, które boki są równej długości i które kąty są równej miary.

**Twierdzenie.** Jeżeli zachodzi choćby jeden z poniższych warunków:

(bbb)  $a = a', b = b', c = c'$ ,

(bkb)  $a = a', \beta = \beta', c = c'$  (lub jeden z dwóch analogicznych),

(kbb)  $\alpha = \alpha', b = b', \gamma = \gamma'$  (lub jeden z dwóch analogicznych),

to trójkąty  $ABC$  i  $A'B'C'$  są przystające.

Intuicja jest następująca. Aby móc jednoznacznie skonstruować trójkąt (na przykład za pomocą cyrkla i liniału), wystarczą jego trzy boki (bbb) lub dwa boki i kąt między nimi (bkb), lub bok i dwa kąty (kbb).

Cechy przystawiania trójkątów to narzędzie, dzięki któremu z *niepełnej* informacji (trzy równości) otrzymujemy informację *pełną* (sześć równości), co pozwala uczynić postępowanie w rozwiązywaniu zadania.

## Zadania

1. Punkty  $A, B, C$  leżą w tej kolejności na jednej prostej, przy czym  $|AB| < |BC|$ . Czworokąt  $ABDE$  jest kwadratem. Okrąg o średnicy  $AC$  przecina prostą  $DE$  w punktach  $P$  i  $Q$ , przy czym punkt  $P$  należy do odcinka  $DE$ . Proste  $AQ$  i  $BD$  przecinają się w punkcie  $R$ . Udowodnić, że  $|DP| = |DR|$ . (*LII Olimpiada Matematyczna*)
2. W czworokącie  $ABCD$  zachodzi równość  $|AB| = |CD|$ . Proste  $AB$  i  $CD$  przecinają się w punkcie  $P$ . Symetralne odcinków  $BC$  i  $DA$  przecinają się w punkcie  $Q$ . Wykazać, że punkty  $B, C, P, Q$  leżą na jednym okręgu. (*X Olimpiada Matematyczna Juniorów, zmodyfikowane*)
3. Dany jest trójkąt  $ABC$ , w którym  $|\sphericalangle ACB| = 60^\circ$ . Na trójkącie tym opisano okrąg  $\omega$ . Punkt  $X$  jest środkiem tego łuku  $BC$  okręgu  $\omega$ , który nie zawiera punktu  $A$ . Punkt  $Y$  jest środkiem tego łuku  $CA$  okręgu  $\omega$ , który nie zawiera punktu  $B$ . Udowodnić, że prosta  $XY$  jest styczna do okręgu wpisanego w trójkąt  $ABC$ . (*XI Olimpiada Matematyczna Juniorów*)
4. Dany jest kwadrat  $ABCD$ . Przez punkt  $A$  przechodzą proste  $\ell_1$  i  $\ell_2$ , które przecinają odcinki, odpowiednio,  $BC$  i  $CD$ . Punkty  $B_1, B_2, D_1, D_2$  są rzutami punktów  $B$  i  $D$  na proste, odpowiednio,  $\ell_1$  i  $\ell_2$ . Dowiedzieć, że  $|B_1B_2| = |D_1D_2|$ .
5. Punkty  $P$  i  $Q$  leżą, odpowiednio, na bokach  $AB$  i  $AC$  trójkąta  $ABC$ , przy czym spełniona jest równość  $|BP| = |CQ|$ . Odcinki  $BQ$  i  $CP$  przecinają się w punkcie  $R$ . Okręgi opisane na trójkątach  $BPR$  i  $CQR$  przecinają się ponownie w punkcie  $S \neq R$ . Udowodnić, że punkt  $S$  leży na dwusiecznej kąta  $BAC$ . (*LXVII Olimpiada Matematyczna*)
6. Punkt  $C$  leży na odcinku  $AB$ . Prosta  $\ell$  przechodzi przez punkt  $C$  oraz przecina okręgi o średnicach  $AC$  i  $BC$  w punktach, odpowiednio,  $K$  i  $L$  (różnych od  $C$ ). Ta sama prosta przecina okrąg o średnicy  $AB$  w punktach  $M$  i  $N$ , przy czym punkty  $M, K, L, N$  leżą na niej w tej kolejności. Wykazać, że  $|KM| = |LN|$ .

**Wskazówki do zadań**

1. Wskazówki wykazują, że trójkąty  $ABP$  i  $ACQ$  są przystające (kbk). Pomoże w tym fakt, że prosta  $AB$  jest styczna do okręgu wpisanego w trójkąt  $ABC$  – odcinki  $AX$  i  $BY$  leżą na przecięciu i wywnioskować tezę z tego, że wysokość z wierzchołka  $A$  ma tę samą długość. Zacząć od wykazania, że  $\triangle ADP_1 \equiv \triangle ABP_2$  oraz  $\triangle ADP_2 \equiv \triangle ABP_1$ . Kropkę nad  $P$  stawia przystawienie  $\triangle AD_1D_2 \equiv \triangle B_1AB_2$ .

2. Dzieląc kąty  $\sphericalangle BPR$  i  $\sphericalangle CQR$  na dwie części, otrzymujemy  $\triangle BPR \equiv \triangle CQR$  i  $\triangle B_1P_1R \equiv \triangle C_1Q_1R$ . Wskazówki wykazują, że  $\triangle B_1P_1R \equiv \triangle C_1Q_1R$  i  $\triangle B_1P_1R \equiv \triangle C_1Q_1R$  co w połączeniu z równością  $|BP| = |CQ|$  dowodzi ich przystawienia. W takim razie odległości punktu  $S$  od prostych  $BP$  i  $CQ$  są równe.

3. Niech  $O_1, O_2$  będą środkami okręgów o średnicach, odpowiednio,  $AB, AC$ . Wskazówki wykazują, że  $\triangle O_1O_2P \equiv \triangle O_1O_2Q$  (diagonalny), a to wynika z przystawienia trójkątów  $KO_1O_2$  i  $LO_2O_1$ .