



# Zadania

Redaguje mgr Krzysztof S. NOWIŃSKI

**M 304.** Niech  $e_1, \dots, e_n$  będzie dowolnym ciągiem złożonym z liczb  $+1, -1$  i niech  $f_1 = e_1, f_i = \frac{e_i}{e_{i-1}}$  dla  $i = 2, \dots, n$ . Wykazać, że

$$(*) \quad \sin\left(\left(e_1 + \frac{e_2}{2} + \frac{e_3}{4} + \dots + \frac{e_n}{2^{n-1}}\right) \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} f_1 \sqrt{2 + f_2 \sqrt{2 + \dots + f_n \sqrt{2}}}$$

Rozwiązanie na str. 4

**M 305.** Trójkąt  $ABC$  porusza się po płaszczyźnie tak, że proste  $AB$  i  $BC$  są styczne do dwóch ustalonych okręgów. Wykazać, że prosta  $AC$  jest również styczna do pewnego stałego okręgu. Rozwiązanie na str. 2

**M 306.** Czy istnieją trójki cyfr  $x, y, z$  takie, że równość

$$\sqrt{\overbrace{xx \dots x}^{2n \text{ cyfr}} - \overbrace{yy \dots y}^{n \text{ cyfr}}} = \overbrace{zz \dots z}^{n \text{ cyfr}}$$

zachodzi dla co najmniej dwóch naturalnych wartości  $n$ ?

Symbol  $abc$  oznacza liczbę  $100a + 10b + c$  itp.

Rozwiązanie na str. 3

Redaguje mgr Tomasz TRATKIEWICZ

**F 119.** Kłoczek o masie  $M$  spoczywa na chropowatej poziomej płaszczyźnie. Wiedząc, że współczynnik tarcia statycznego między klockiem i powierzchnią wynosi  $f$ , znaleźć najmniejszą siłę potrzebną do jego przesunięcia.

Rozwiązanie na str. 5

**F 120.** Ciało ślizga się po poziomej chropowatej powierzchni. Jak wielką siłę równoległą do płaszczyzny i prostopadłą do prędkości ciała należy przyłożyć, aby nastąpiła zmiana kierunku ruchu?

Rozwiązanie na str. 16

## Zadania, których nie umiemy rozwiązać

Problem, który chcemy przedstawić, dotyczy układu równań

$$(*) \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_k = y_1 + y_2 + \dots + y_k \\ x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_k^2 = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_k^2 \\ \dots \\ x_1^n + x_2^n + \dots + x_k^n = y_1^n + y_2^n + \dots + y_k^n \end{cases}$$

Oczywiście układ ten ma rozwiązania: wystarczy nadać niewiadomym  $x_1, x_2, \dots, x_k$  dowolne wartości, ciąg zaś  $(y_1, y_2, \dots, y_k)$  określić jako dowolną permutację ciągu  $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ . Rozwiązanie tak otrzymane nazwiemy trywialnym. Rozwiązania nietrywialne mogą istnieć tylko w przypadku, gdy  $k \geq n+1$  (w dowodzie wykorzystuje się wzory Newtona z teorii funkcji symetrycznych).

Zauważmy, że jeśli ciąg  $(a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_k)$  jest rozwiązaniem układu (\*), to ciąg  $(m+a_1, m+a_2, \dots, m+a_k, m+b_1, m+b_2, \dots, m+b_k)$  ( $m$  — dowolna liczba) również jest takim rozwiązaniem (w dowodzie wykorzystuje się wzór dwumianowy). Wynika stąd, że jeżeli układ (\*) ma rozwiązanie, to ma rozwiązanie, w którym  $x_1 = 0$ . Zachodzi następujące twierdzenie (w dowodzie korzysta się z znów z wzoru dwumianowego):

Jeżeli  $(a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_k)$  jest rozwiązaniem układu (\*), to dla dowolnego  $d$  ciąg  $(a_1, a_2, \dots, a_k, b_1+d, b_2+d, \dots, b_k+d; b_1, b_2, \dots, b_k, a_1+d, a_2+d, \dots, a_k+d)$  jest rozwiązaniem układu

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_{2k} = y_1 + y_2 + \dots + y_{2k} \\ x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{2k}^2 = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_{2k}^2 \\ \dots \\ x_1^{n+1} + x_2^{n+1} + \dots + x_{2k}^{n+1} = y_1^{n+1} + y_2^{n+1} + \dots + y_{2k}^{n+1} \end{cases}$$

Interesować nas będzie istnienie rozwiązań nietrywialnych układu (\*) w liczbach całkowitych przy możliwie małym  $k$ , np.  $k = n+1$ . Dla  $n = 1, k = 2$  mamy np.  $1+4 = 2+3$ ; dla  $n = 2, k = 3$  rozwiązaniem jest np. ciąg  $(1, 5, 6; 2, 3, 7)$ . Wiadomo, że dla  $k = n+1$  rozwiązania istnieją dla  $n \leq 9$ .

**Problem.** Czy istnieją rozwiązania nietrywialne układu (\*) w liczbach całkowitych przy  $k = n+1 \geq 11$ ?

Pokażemy teraz możliwy sposób zaatakowania tego problemu przedstawiając sposób otrzymania rozwiązania dla  $n = 6$ .

Ciąg  $(0, 7, 11, 17, 18, 24, 28, 35; 1, 8, 12, 15, 20, 23, 27, 34)$  jest rozwiązaniem układu (\*) dla  $n = 1, k = 8$ . Stosując przytoczone powyżej twierdzenie kolejno dla  $d = 7, 11, 13, 17, 19$  i redukując równe wartości niewiadomych  $x_i, y_i$  dochodzimy do rozwiązania  $(0, 18, 27, 58, 64, 89, 101; 1, 13, 38, 44, 75, 84, 102)$ . Nasuwa się tu pytanie: z jakiego rozwiązania startować i jakie przyjmować wartości  $d$ ? Ale to już pytanie dla Czytelników.

Powyższe uwagi sugerują, że rozwiązanie nietrywialne dla  $k = n+1 = 11$  istnieje, ale naprawdę tego nie wiadomo. Byłoby interesujące znaleźć choćby rozwiązanie w liczbach całkowitych w przypadku  $n = 10, k \leq 13; n = 11, k \leq 13; n = 12, k \leq 19; n = 13, k \leq 29$ .

Powyższy problem łączy się z następującym:

Podać przykład takiego ciągu liczb naturalnych  $(c_p)$  szybko rosnącego, że

$$\sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{c_p}$$
 jest liczbą wymierną i istnieje liczba całkowita  $k \neq 0$ , dla której

$$\sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{k+c_p}$$
 jest też liczbą wymierną.

Otóż jeżeli  $(a_1, a_2, \dots, a_{n+1}; b_1, b_2, \dots, b_{n+1})$  jest rozwiązaniem układu (\*) dla  $k = n+1$ , to można przyjąć  $c_p = (p+a_1)(p+a_2) \dots (p+a_{n+1})$  i wtedy różnica  $(p+b_1)(p+b_2) \dots (p+b_{n+1}) - c_p$  jest liczbą całkowitą  $k$  różną od zera,

niezależną od  $p$ . Ponadto  $\frac{1}{c_p}$  i  $\frac{1}{k+c_p}$  są liczbami wymiernymi, co można

$$\text{udowodnić wykorzystując fakt, że } \frac{1}{(p+a_1)(p+a_2) \dots (p+a_{n+1})} =$$

$$= \frac{A_1}{p+a_1} + \frac{A_2}{p+a_2} + \dots + \frac{A_{n+1}}{p+a_{n+1}}, \text{ gdzie } A_1, A_2, \dots, A_{n+1} \text{ są pewnymi liczbami wymiernymi.}$$



Wenus z Willendorf.