

## O wieżach, permanencie i parzystości

Na szachownicy o wymiarach  $n \times n$  zakryto część pól i zapytano nas, na ile sposobów można ustawić na niej  $n$  wież tak, by żadna z wież nie stała na zakrytym polu i nie groziła innej (tzn. w każdym wierszu i w każdej kolumnie musi stać dokładnie jedna wieża).

Jeśli przedstawimy szachownicę jako zero-jedynkową macierz  $A = (a_{i,j})$  wymiaru  $n \times n$ , w której  $a_{i,j} = 0$  wtedy i tylko wtedy, gdy pole leżące na przecięciu  $i$ -tego wiersza i  $j$ -tej kolumny jest zakryte, to nietrudno będzie się przekonać, że odpowiedzią jest wartość wyrażenia

$$\sum_{\pi} a_{1,\pi(1)} a_{2,\pi(2)} \cdots a_{n,\pi(n)},$$

w którym sumowanie rozciąga się na wszystkie permutacje  $\pi$  zbioru  $\{1, \dots, n\}$ . To wyrażenie fachowo nazywa się *permanentem* macierzy  $A$  i jego wyznaczenie jest problemem na tyle trudnym obliczeniowo, że nie znamy żadnego algorytmu, który robiłby to szybciej niż w czasie wykładniczym.

Dostaliśmy jednak szansę na rehabilitację, gdyż postawiono drugie pytanie: czy liczba poprawnych ustawień wież jest parzysta? Okazuje się, że w istocie takie pytanie jest prostsze.

Definicja permanentu może wydać się znajoma tym, którzy znają permutacyjną definicję wyznacznika macierzy. W istocie, wygląda ona bardzo podobnie:

$$\det(A) := \sum_{\pi} \operatorname{sgn}(\pi) a_{1,\pi(1)} a_{2,\pi(2)} \cdots a_{n,\pi(n)},$$

gdzie funkcja  $\operatorname{sgn}(\pi)$  jest tzw. znakiem permutacji; dla nas będzie istotne, że przyjmuje ona wartości  $\pm 1$ . Kluczową obserwacją jest, że  $-1 \equiv 1 \pmod{2}$ , zatem wyznacznik i permanent tej samej całkowitoliczbowej macierzy są zawsze tej samej parzystości!

To pozwala nam sprowadzić problem do obliczenia wartości wyznacznika modulo 2, co możemy zrobić chociażby w czasie  $O(n^3)$ , korzystając z metody eliminacji Gaussa.

Tomasz IDZIASZEK



## Zadania

Redaguje Waldemar POMPE

**M 1291.** W pola szachownicy  $m \times n$ , gdzie  $m$  i  $n$  są większe od 1, wpisano liczby  $1, 2, \dots, mn$ . Pola, w których znajdują się liczby  $i$  oraz  $i + 1$ , mają wspólny bok dla każdego  $i$ . Wykazać, że istnieje liczba  $k$  oraz dwa pola mające wspólny bok, w których znajdują się liczby  $k$  oraz  $k + 3$ .

Rozwiązanie na str. 2

**M 1292.** Wykazać, że istnieje zbiór złożony ze 100 różnych liczb całkowitych dodatnich o tej własności, że suma dowolnych elementów tego zbioru nie jest potęgą liczby naturalnej o wykładniku większym lub równym 2.

Rozwiązanie na str. 3

**M 1293.** Dany jest staw w kształcie koła oraz trzy ustalone proste  $k, l, m$ . Z punktu  $A$  znajdującego się na brzegu stawu wypływa ryba i płynie w kierunku równoległym do prostej  $k$ . Po dotarciu do brzegu ryba zakreca i płynie dalej w kierunku wyznaczonym przez prostą  $l$ . Po ponownym dotarciu do brzegu stawu ryba kontynuuje swoją podróż w analogiczny sposób, obierając kolejno kierunki  $m, k, l$  oraz  $m$ . Wykazać, że po zakończeniu tej wędrówki ryba znajduje się w wyjściowym punkcie  $A$ .

Rozwiązanie na str. 14

Redaguje Ewa CZUCHRY

**F 773.** Okrągły, płaski lep na muchy zbliża się z prędkością  $\mathbf{v}$ , skierowaną wzdłuż prostopadłej do płaszczyzny lepu, do roju much poruszającego się z prędkością  $\mathbf{u}$ , prostopadłą do  $\mathbf{v}$ . Muchy lecą w obszarze ograniczonym dwiema płaszczyznami prostopadłymi do kierunku ruchu lepu, płaszczyzny te są odległe o  $d$ . W jednostce objętości znajduje się  $n$  much, promień lepu wynosi  $R$ . Ile much złapie lep?

Rozwiązanie na str. 24

**F 774.** Bombka choinkowa tłucze się przy zderzeniu z podłogą po upadku z wysokości równej co najmniej  $h$ . Z jaką minimalną prędkością musi się poruszać taka bombka, żeby po zderzeniu z taką samą, spoczywającą, obie się rozbiły? Zakładamy, że druga bombka jest zawieszona w powietrzu, prędkość zaś pierwszej bombki skierowana jest wzdłuż prostej łączącej środki bombek.

Rozwiązanie na str. 8

